



Колики, запоры и незначительные срыгивания*

Срыгивания различной интенсивности**

Минимальные расстройства пищеварения

Диарея (лактазная недостаточность)

Кожные и гастроинтестинальные симптомы аллергии к белкам коровьего молока



NUTRILON® КОМФОРТ



NUTRILON® АНТИРЕФЛЮКС



NUTRILON® ПЕПТИ ГАСТРО



NUTRILON® БЕЗЛАКТОЗНЫЙ



NUTRILON® КИСЛОМОЛОЧНЫЙ

Диетотерапия при проблемах пищеварения

NUTRICIA
Nutrilon®

* Срыгивания объемом до 5 мл.

** Любой интенсивности.

Грудное молоко – лучшее питание для детей раннего возраста. Информация только для сотрудников системы здравоохранения.

АЛГОРИТМ ПОДБОРА ДИЕТОТЕРАПИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ¹

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЖКТ²

ИСКЛЮЧИТЬ АБКМ*!

Кожные симптомы АБКМ*:

- Зуд кожи
- Эритема, папулы, микровезикулы с локализацией на лице и разгибательных поверхностях конечностей
- Периаанальный дерматит

Гастроинтестинальные симптомы АБКМ*:

- Слизь и прожилки крови в стуле
- «Запорный понос» (редкие эпизоды дефекации, при этом жидкая консистенция стула)

ПЕПТИ ГАСТРО

- 100% рациона
- Длительность применения не ограничена, но не менее 6 мес.

NB! Постепенное введение для привыкания ребенка к особому вкусу гидролизованного белка

КОЛИКИ

- Возраст < 5 мес.
- Беспричинный плач и беспокойство
- Нет недостаточного набора веса, лихорадки или болезни

ЗАПОРЫ

- Возраст 1 мес. – 4 года
- < 2 дефекаций в неделю
- Задержка стула
- Болезненные дефекации
- Большой диаметр стула
- Остаточный объем кала в прямой кишке

СРЫГИВАНИЯ < 5 МЛ** > 5 МЛ

- Возраст 3 нед. – 12 мес.
- Срыгивания > 2 р/д в течение > 3 нед.
- Отсутствие прожилок крови, аспирации, апноэ, недостаточного набора веса, проблем с глотанием, нарушений в технике и позе кормления

ДИАРЕЯ

- Жидкий, пенистый стул с кислым запахом
- Метеоризм

ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ОКИ ***

- Неустойчивый стул
- Нарушение состава кишечной микробиоты
- Снижение аппетита

КОМФОРТ

- 100% рациона/в сочетании с грудным молоком
 - Длительность применения не ограничена, но не менее 3 мес.
 - Использование соски с отверстием большего диаметра
 - Перемешивать круговыми движениями (не взбалтывать)
- NB!** Максимальный эффект в течение 2 недель использования
- Особый вкус из-за гидролизованного белка
 - Возможно изменение окраски стула

АНТИРЕФЛЮКС

- До 100% рациона
 - Разовый объем от 30 мл на одно кормление
 - В отдельной бутылочке перед основным питанием
- NB!** При срыгиваниях любой интенсивности

БЕЗЛАКТОЗНЫЙ

- До 100% рациона
 - Длительность применения не ограничена
 - До купирования симптомов + 2 нед.
- NB!** Возможна индивидуальная дотация лактозы

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ

- До 100% рациона
 - Длительность применения не ограничена
- NB!** Возможно применение с рождения

*АБКМ – аллергия к белкам коровьего молока.

** – При срыгиваниях объемом до 5 мл показан «Nutrilon Комфорт», при любых срыгиваниях, в том числе интенсивных, показан «Nutrilon Антирефлюкс».

*** ОКИ – острые кишечные инфекции.

¹ Vandenplas Y et al. Functional gastro-intestinal disorder algorithms focus on early recognition, parental reassurance and nutritional strategies. Acta Paediatr 2016; 105:244-52.

² Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта согласно IV Римским критериям (Drossman D.A. et al. Rome IV-Functional GI disorders: disorders of gut-brain interaction. Gastroenterology. 2016; 150 (6): 1257-1261).