



Алгоритм обследования и подбора диетотерапии для детей с симптомами непереносимости и смешанном вскармливании

Эффективная диетотерапия при проблемах пищеварения

- Колики, запоры, легкие срыгивания
- Срыгивания различной интенсивности
- Минимальные расстройства пищеварения
- Диарея (лактазная недостаточность)
- Пищевая непереносимость



ЭФФЕКТИВНАЯ ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ ПРОБЛЕМАХ ПИЩЕВАРЕНИЯ

КОЛИКИ

NUTRILON® КОМФОРТ.

ОБЛЕГЧАЕТ КОЛИКИ, ЗАПОРЫ, ЛЕГКИЕ СРЫГИВАНИЯ



С 0 до 6 мес

С 6 до 12 мес

- Уникальный комплекс пребиотиков scGOS/lcFOS Нормализует микрофлору кишечника
- β-пальмитат Обеспечивает мягкий стул и профилактику запоров
- Прежелатинизированный крахмал Препятствует заглатыванию воздуха
- Частично гидролизованный белок Легко переваривается
- Сниженная лактоза Хорошо переносится при транзиторной лактазной недостаточности

СРЫГИВАНИЕ

NUTRILON® АНТИРЕФЛЮКС.

ЭФФЕКТИВНАЯ ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ СРЫГИВАНИЯХ



С рождения

- Камедь бобов рожкового дерева Увеличивает вязкость смеси, препятствует заглатыванию воздуха, препятствует обратному забросу содержимого из желудка, стимулирует пассаж по кишечнику
- Альбумин/казеин в соотношении 20/80 Который стимулирует работу пилорического сфинктера, способствует сохранению повышенной вязкости смеси в желудке
- Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ARA, DHA) Обеспечивают развитие головного мозга и зрения

ДИАРЕЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ ДИАРЕЕ



С рождения

С рождения

- Не содержит лактозы
- Осмоляльность 170 мосм/кг Позволяет эффективно купировать диарею
- 100% казеин Замедляет скорость пассажа по кишечнику, увеличивает продолжительность всасывания
- Облегчение кожных и гастроинтестинальных симптомов пищевой аллергии
- Хорошая переносимость

Грудное вскармливание – лучшее питание для детей раннего возраста. Информация только для сотрудников системы здравоохранения

Колики, запоры и незначительные срыгивания

Минимальные расстройства пищеварения

Диарея (лактазная недостаточность)

Срыгивания различной интенсивности

Пищевая непереносимость



Nutrilon® КОМФОРТ



Nutrilon® КИСЛОМОЛОЧНЫЙ



Nutrilon® БЕЗЛАКТОЗНЫЙ



Nutrilon® АНТИРЕФЛЮКС



Nutrilon® ПЕПТИ ГАСТРО

Грудное вскармливание – лучшее питание для детей раннего возраста. Информация только для сотрудников системы здравоохранения

Nutrilon® КОМФОРТ



- Постепенное введение в течение 5 дней, начиная с 30 мл до полного объема кормления. Новые продукты дают в первой половине дня
- 100% рациона
- Возможно сочетание с грудным молоком
- Начальный эффект появляется на 3-4 день применения
- Рекомендовано использование соски с отверстием большего диаметра
- Перемешивать круговыми движениями (не взбалтывать)
- У смеси особый вкус из-за расщепленного белка
- Возможно изменение окраски стула
- Продолжительность приема не ограничена, но не менее 3-х месяцев

Грудное вскармливание – лучшее питание для детей раннего возраста. Использовать по рекомендации специалиста

Nutrilon® КИСЛОМОЛОЧНЫЙ



- Постепенное введение в течение 5 дней, начиная с 30 мл до полного объема кормления. Новые продукты дают в первой половине дня
- 100% рациона или в сочетании с грудным молоком
- Возможно применение в сочетании с базовой смесью
- Длительность приема не ограничена

Грудное вскармливание – лучшее питание для детей раннего возраста. Использовать по рекомендации специалиста

Nutrilon® БЕЗЛАКТОЗНЫЙ



- Постепенное введение в течение 5 дней, начиная с 30 мл до полного объема кормления. Новые продукты дают в первой половине дня
- При первичной лактазной недостаточности: длительность приема не ограничена
- При вторичной лактазной недостаточности: 100% рациона до купирования симптомов + 2 недели

Грудное вскармливание – лучшее питание для детей раннего возраста. Использовать по рекомендации специалиста

Nutrilon® АНТИРЕФЛЮКС



- Введение начинают с 30 мл и постепенно достигают объема, который купирует срыгивания. Новую смесь дают в первой половине дня
- Смесь Nutrilon® Антирефлюкс дают в отдельной бутылочке перед кормлением смесью или перед кормлением грудью
- Возможна полная замена рациона
- Возможно сочетание с грудным молоком или базовой смесью

Грудное вскармливание – лучшее питание для детей раннего возраста. Использовать по рекомендации специалиста

Nutrilon® ПЕПТИ ГАСТРО



- Смесь вводят утром, в начале кормления.
- По мере увеличения количества смеси Nutrilon® Пепти Гастро, объем привычной смеси уменьшают. Смеси разводят в разных емкостях, а потом смешивают в одной бутылочке
- В случае искусственного вскармливания ребенок должен получать смесь в 100% рациона. Продолжительность приема не ограничена, но не менее 6 месяцев или до достижения ребенком 1 года жизни
- На фоне приема Nutrilon® Пепти Гастро стул ребенка может приобретать зеленый оттенок. Эта особенность характерна для всех смесей на основе гидролиза белка.
- При смешанном вскармливании, мать ребенка должна соблюдать строгую безмолочную диету.
- Если у ребенка имеются анафилактические/жизнеугрожающие состояния на фоне неадекватной диетотерапии показано одномоментная замена смеси на высокогидролизную/аминокислотную, что позволяет быстро снизить антигенную нагрузку и быстрее стабилизировать состояние ребенка.

Грудное вскармливание – лучшее питание для детей раннего возраста. Использовать по рекомендации специалиста

день введения	количество смеси на один прием, мл	количество ложек смеси	кратность приема	количество в сутки, мл
1-й день	30	1	1	30
2-й день	30	1	3	90
3-й день	60	2	4	160
4-й день	90	3	5	450
5-й день	120	4	5-6	600-720
с 6-го дня	Полный объем кормления			

день введения	количество смеси на один прием, мл	количество ложек смеси	кратность приема	количество в сутки, мл
1-й день	30	1	1	30
2-й день	30	1	3	90
3-й день	60	2	4	160
4-й день	90	3	5	450
5-й день	120	4	5-6	600-720
с 6-го дня	Полный объем кормления			

При использовании Nutrilon® Безлактозный возможно осуществить точное дозирование лактозы и подобрать индивидуальную лактозную нагрузку. Это позволяет вводить в рацион ребенка необходимую галактозу (моносахарид лактозы) и осуществляет «тренировку» собственной микрофлоры



=

Точное дозирование лактозы



Внимание! Эффективная доза подбирается индивидуально.

день введения	количество смеси на один прием, мл	количество ложек смеси	кратность приема	количество в сутки, мл
1-й день	30	1	1	30
2-й день	30	1	3	90
3-й день	60	2	4	160
4-й день	90	3	5	450
5-й день	120	4	5-6	600-720
с 6-го дня	Полный объем кормления			

день введения	количество смеси на один прием, мл	количество ложек смеси	кратность приема	количество в сутки, мл
1-й день	30	1	1	30
2-й день	30	1	3	90
3-й день	60	2	4	160
4-й день	90	3	5	450
5-й день	120	4	5-6	600-720
с 6-го дня	Полный объем кормления			